



Noms vernaculaires

Fabaceae

Français : faux kinkéliba,
casse puante

Mooré : kīnkelibà

Lyle : kīnkelibà

Dioula : lohomaba

Botanique

Cet arbrisseau pouvant atteindre 2 à 3 mètres de haut a des feuilles pétiolées (5 ou 6 paires) pouvant atteindre 10 centimètres à la base desquelles se trouve une petite glande. Ses fleurs jaunes donnent des gousses.



Usages thérapeutiques et posologie

Partie utilisée : feuille.

Constipation : adulte, décoction de 15 grammes de feuilles par litre d'eau à boire au coucher. Réservé à un usage occasionnel, ce traitement ne doit pas être prolongé au-delà de trois jours et est contre-indiqué chez les enfants, les femmes enceintes, allaitantes et personnes âgées.

Affection de la peau et des muqueuses, nombreuses mycoses dont teignes et candidoses, allergies cutanées : utiliser une décoction concentrée en bain, en compresses ou en cataplasme de feuilles directement sur la peau.



Médecine traditionnelle burkinabè

La décoction de la plantes est utilisée pour le soin des affections du foie, de la constipation et des rhumatismes. En usage externe, elle sert à soigner les affections de la peau, les abcès et les œdèmes.



Propriétés pharmacologiques

Les feuilles sont laxatives, anti-inflammatoires, antibactériennes et antifongiques.

Toxicité

La plante a une toxicité non négligeable. L'usage interne est à surveiller. Il ne faut pas utiliser la plante de façon prolongée. La plante est abortive par voie interne. Son usage est à déconseiller aux femmes enceintes, allaitantes, aux jeunes enfants et aux personnes âgées. Son usage externe ne pose aucun risque.

